

MALASEBTM

獣医師処方用ボトル

マラセブ[®]

動物用医薬品

(外用)

【有効成分(100mL中)】

ミコナゾール硝酸塩(抗真菌成分) 2.0g

クロルヘキシジングルコン酸塩(殺菌成分) 2.0g

【効能・効果】

犬：マラセチア皮膚炎

このボトルは獣医師処方専用です。
ペットショップ、インターネット等で
小分け販売することは禁止されています。

このボトルは再使用しないでください。

200mL



®登録商標

【用法・用量】

犬の被毛を温湯又は水で十分に湿らせ、本剤を全身に擦り込むように泡立てる。10分間放置した後、薬液を残さないように全身を温湯又は水で十分に濯ぎ洗う。

投与回数は1日1回、3日以上間隔をあけて週2回投与する。1回当たりの基準使用量は体表面積に対して50mL/m²とする。体重と体表面積の関係から、体重別の投与量は下表のとおりとし、該当する範囲内で被毛長等を考慮して十分な泡立ちが得られ、流れ落ちない投与量を選択する。

| 体重 | 1回当たりの投与量 | 体重 | 1回当たりの投与量 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.5~3kg未満 | 5~10mL | 15~20kg未満 | 30~40mL |
| 3~5kg未満 | 10~15mL | 20~30kg未満 | 40~50mL |
| 5~10kg未満 | 15~25mL | 30~40kg未満 | 50~60mL |
| 10~15kg未満 | 25~30mL | 40~50kg未満 | 60~70mL |

【使用上の注意】

- 1)本剤はクロルヘキシジン製剤又はミコナゾール製剤に対して過敏症の既往歴のある犬には使用しないこと。
- 2)本剤は生後3ヶ月齢未満の犬には使用しないこと。
- 3)粘膜面及び耳、眼には使用しないこと。
- 4)眼に入らないよう注意すること。
- 5)妊娠中又は授乳中の犬には使用しないこと。
- 6)本剤の使用により発疹等の副作用が認められた場合には、速やかに使用を中止し、獣医師の診察を受けること。
- 7)2週間使用しても症状の改善が見られない場合には獣医師に相談すること。
- 8)本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。
- 9)獣医師が処方で指定した期間内に使用すること。

製品の使用に際しては、添付文書を使用前に熟読し使用方法を守って使用すること。
本剤は飲めません。
小児の手の届かないところに保管すること。

動物病院名 _____